

# Campirogel

gel



3133

**Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!** Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

**Kaj vsebuje navodilo:**

1. Kaj je zdravilo Campirogel in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Campirogel
3. Kako uporabljati zdravilo Campirogel
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Campirogel
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

## 1. KAJ JE ZDRAVILO CAMPIROGEL IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Campirogel uporabljajte za lajšanje bolečin in vnetja pri blažjih oblikah revmatskih obolenj. Pomaga tudi pri športnih in drugih poškodbah, kot so zvini, nategi in udarnine, kadar ni poškodovana tudi koža.

Ibuprofen je zdravilna učinkovina iz skupine nesteroidnih protivnetnih zdravil - lajša bolečino ter zmanjšuje vnetje in oteklino. Eterični olji ruševja in navadnega rožmarina ter racemna kafra izboljšujejo prekrvavitve na mestu nanosa na kožo in delujejo blago protibolečinsko.

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO CAMPIROGEL

### Ne uporabljajte zdravila Campirogel

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila, acetilsalicilno kislino ali druga nesteroidna protivnetna zdravila ter če ste v preteklosti ob uporabi teh zdravil imeli astmatični napad, koprivnico, angioedem (otekanje podkožnega tkiva ali sluznic) ali vnetje nosne sluznice,
- v času nosečnosti in dojenja,
- otroci, mlajši od 12 let.

Campirogel ni primeren za osebe s sladkorno boleznijo in motnjami krvnega obtoka.

### Opozorila in previdnostni ukrepi

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v 1 tednu, se morate posvetovati z zdravnikom.

Obisk zdravnika je nujen, če bolečine v sklepih spremljajo tudi otekanje sklepov, rdečina ali vročina.

Izogibajte se dolgotrajni uporabi Campirogela na večjih površinah kože.

Ker del ibuprofena (okrog 5 %) prehaja skozi kožo v krvni obtok, je ob uporabi zdravila potrebna posebna previdnost pri obolenjih ledvic, jeter, srca in ožilja, razjedah na želodcu, krvavitvah iz prebavil in drugih krvavitvah, kroničnih vnetnih črevesnih obolenjih ter obolenjih vezivnega tkiva.

Campirogel lahko nanašate samo na zdravo in nepoškodovano kožo. Ne nanašajte ga na rane ali druge odprte poškodbe, hudo vneto ali okuženo kožo.

Predela kože, na katerega ste nanesli zdravilo, ne izpostavljajte sončni svetlobi; prav tako tega predela ne prekrivajte s povoji, obliži ali kakršnimi koli drugimi obvezami.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi, usti in sluznicami; če se to zgodi, prizadete predele izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Samo za zunanjo uporabo!

### Otroci in mladostniki

Campirogela naj ne uporabljajo otroci, mlajši od 12 let.

### Druga zdravila in zdravilo Campirogel

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Odsvetujemo sočasno nanašanje Campirogela in drugih zdravil na boleči predel.

Previdnost je potrebna pri sočasni uporabi nesteroidnih protivnetnih zdravil v obliki kapsul ali tablet.

### Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Ne uporabljajte Campirogela med nosečnostjo in dojenjem.

### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Ni znano, da bi Campirogel vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

### Zdravilo Campirogel vsebuje propilenglikol, metilparahidroksibenzoat in propilparahidroksibenzoat

To zdravilo vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože, ter metilparahidroksibenzoat (E218) in propilparahidroksibenzoat (E216), ki lahko povzročita alergijske reakcije (lahko zapoznele).

### 3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO CAMPIROGEL

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Campirogel nežno vtrite do trikrat dnevno v tankem sloju na boleči predel.

Zdravila ne uporabljajte pogosteje kot na vsake 4 ure.

Odmerjanje prilagodite velikosti prizadetega predela; običajno zadostuje 4 do 10 cm gela.

#### Če ste uporabili večji odmerek zdravila Campirogel, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Preveliko odmerjanje Campirogela lahko povzroči draženje kože.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, kožo temeljito sperite s tekočo vodo.

#### Če ste pozabili uporabiti zdravilo Campirogel

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Na mestu nanosa Campirogela se lahko pojavijo draženje kože, rdečina, srbenje, pekoč občutek, kožni izpuščaji in preobčutljivostne reakcije, vključno s kontaktnim dermatitisom (vnetje kože na mestu nanosa). Zelo redko, predvsem pri bolnikih z astmo ali alergijami, se lahko pojavijo hujše preobčutljivostne reakcije v obliki kožnih reakcij, vnetja nosne sluznice, astmatičnega napada, angioedema (otekanje podkožnega tkiva ali sluznic) in anafilaktičnega šoka (življenjsko nevarna, takojšnja preobčutljivostna reakcija); to so resni neželeni učinki, ki zahtevajo nujno zdravniško pomoč. Obstajajo poročila o Stevens-Johnsonovem sindromu (resna kožna reakcija), preobčutljivosti kože na sončno svetlobo in buloznem levkocitoklastičnem vaskulitisu (vnetje krvnih žil).

#### Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CAMPIROGEL

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!** Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

### 6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

#### Kaj vsebuje zdravilo Campirogel

1 g gela vsebuje 50 mg ibuprofena, 50 mg racemne kafe, 50 mg eteričnega olja ruševja (*Pinus mugo* Turra, aetheroleum) in 50 mg eteričnega olja navadnega rožmarina (*Rosmarinus officinalis* L., aetheroleum).

Pomožne snovi: prečiščena voda, etanol, poloksamer, propilenglikol (E1520), metilparahidroksibenzoat (E218), propilparahidroksibenzoat (E216).

#### Izgled zdravila Campirogel in vsebina pakiranja

Campirogel je gel, bele barve, značilnega vonja po kafri in eteričnih oljih.

Pakiranje je škattla z aluminijasto tubo, v kateri je 50 g gela, s priloženim navodilom za uporabo.

#### Način izdaje zdravila Campirogel

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

#### Proizvajalec

Gorenjske lekarne, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarne.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 28. 4. 2021.

