



# Otokain

kapljice za uho, raztopina  
lidokainijev klorid/etakridinijev laktat monohidrat

## **Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.
- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

- Kaj vsebuje navodilo:**
1. Kaj je zdravilo Otokain in za kaj ga uporabljamo
  2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Otokain
  3. Kako uporabljati zdravilo Otokain
  4. Možni neželeni učinki
  5. Shranjevanje zdravila Otokain
  6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

---

## 1. KAJ JE ZDRAVILO OTOKAIN IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Otokain lajša bolečine v ušesih ob vnetju.

Lidokainijev klorid lajša bolečino na mestu nanosa. Etakridinijev laktat monohidrat deluje antiseptično.

---

## 2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO OTOKAIN

### **Ne uporabljajte zdravila Otokain**

- če ste alergični na katero od sestavin zdravila
- če imate poškodovan bobnič.

### **Opozorila in previdnostni ukrepi**

Pred začetkom uporabe zdravila se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo, se morate posvetovati z zdravnikom.

Pri močnejših bolečinah v ušesih ali bolečinah, ki se stopnjujejo, je nujen obisk zdravnika.

Otokain ni primeren za dolgotrajno uporabo.

Previdnost je potrebna ob uporabi zdravila pri hujših obolenjih srca, ledvic ali jeter.

Zdravilo ne sme priti v stik z očmi; če se to zgodi, oči izpirajte z veliko količino mlačne vode.

Ni za uživanje!

### **Otroci in mladostniki**

O uporabi Otokaina pri otrocih se posvetujte z zdravnikom.

### **Druga zdravila in zdravilo Otokain**

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če uporabljate, ste pred kratkim uporabljali ali pa boste morda začeli uporabljati katero koli drugo zdravilo.

Ni poročil o medsebojnem delovanju Otokaina z drugimi zdravili.

Zdravila ne vkapajte v uho sočasno z drugimi zdravili za zdravljenje ušes, saj se učinkovitost teh lahko zmanjša zaradi izločanja iz sluhovoda.

### **Nosečnost in dojenje**

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

Zaradi pomanjkanja podatkov o varnosti odsvetujemo uporabo Otokaina med nosečnostjo in dojenjem.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi Otokain vplival na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji.

### **Zdravilo Otokain vsebuje etanol**

To zdravilo vsebuje propilenglikol (E1520), ki lahko povzroči draženje kože.

### 3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO OTOKAIN

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Vkapajte trikrat do štirikrat dnevno po 2 kapljici v boleče uho.

#### Če ste uporabili večji odmerek zdravila Otokain, kot bi smeli

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, in se ob tem pojavijo neželeni učinki, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Ni poročil o primerih prevelikega odmerjanja Otokaina.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, uho temeljito sperite s tekočo vodo.

#### Če ste pozabili uporabiti zdravilo Otokain

Ne uporabite dvojnega odmerka, če ste pozabili uporabiti prejšnji odmerek.

Nadaljujte z uporabo zdravila v skladu z navodilom za uporabo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

### 4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Otokain lahko povzroči draženje kože in preobčutljivostne reakcije.

Ob pojavu vrtoglavice, slabosti in nehotenih ritmičnih gibov zrkla takoj prenehajte z uporabo zdravila, saj so ti neželeni učinki lahko posledica prehajanja lidokainijevega klorida v notranje uho.

#### Poročanje o neželenih učinkih

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu.

O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na nacionalni center za poročanje:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Sektor za farmakovigilanco, Nacionalni center za farmakovigilanco

Slovenčeva ulica 22, SI-1000 Ljubljana

telefon: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si, spletna stran: www.jazmp.si

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

### 5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA OTOKAIN

**Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!** Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Plastenko shranjujte zaščiten pred svetlobo.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake »Uporabno do:«. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

### 6. VSEBINA PAKIRANJA IN DODATNE INFORMACIJE

#### Kaj vsebuje zdravilo Otokain

1 g kapljic za uho, raztopine (20 kapljic) vsebuje 20 mg lidokainijevega klorida in

0,4 mg etakridinijevega laktata monohidrata.

Pomožne snovi: glicerol (E422), prečiščena voda, propilenglikol (E1520).

#### Izgled zdravila Otokain in vsebina pakiranja

Otokain je bistra, rumenozelena tekočina, brez vonja.

Pakiranje je škatla s kapalno plastenko, v kateri je 10 ml kapljic za uho, raztopine, s priloženim navodilom za uporabo.

#### Način izdaje zdravila Otokain

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah. Izdelek je galensko zdravilo.

#### Proizvajalec

Gorenjske lekarnе, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj

enota Galenski laboratorij, Bleiweisova cesta 8, 4000 Kranj

telefon: 04 20 16 159, faks: 04 20 16 157, e-pošta: g.laboratorij@gorenjske-lekarnе.si

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 1. 10. 2020.

